GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: % (w/w)
Organik Madde	:10
Toplam Azot(N)	:4
Üre Azotu (N-NH2)	:4
Toplam Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	:15
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P_2O_5)	:15
Suda Çözünür Bor (B)	:2
Suda Çözünür Çinko(Zn)	:5
Max Klor	:0,5
pH	:1-3

UYARILAR :

- KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ.
- SU İLE KARIŞTIRDIKTAN SONRA BEKLETMEDEN KULLANINIZ.
- Önce kullanım talimatlarını okuyunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız.
- Sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Yutulduğunda zararlıdır, hemen doktora başvurunuz.
- Gübre tozlarını teneffüs etmeyiniz.
- Deri ve göz ile temasından kaçınınız.
- Gübreleme esnasında bir şey yemeyiniz ve içmeyiniz.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız.
- Boş ambalajlarla doğayı kirletmeyiniz.
- Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA KOŞULLARI :

- Direk gün ışığı almayan, nemsiz ve kuru ortamda, +5 ile 30 °C sıcaklıkta saklayınız.
- Gübre, yanıcı ve patlayıcı özellikte değildir.
- Taşıma ve depolama esnasında ambalajların yırtılmamasına gayret gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK :

- Diğer taban gübreleri, ilaçlar ve sıvı gübreler ile birlikte kullanmadan önce küçük bir kapta test edilmelidir.
- Ürünün yanlış kullanımı yüzünden doğabilecek olumsuz koşullardan firmamız sorumlu tutulamaz.

Parti No. :
Ürt. Tarihi :
Son Kull. Tar. : + 3 YIL
Lisans No : 1990
Tescil No. :
Net Hacim : 1 L ☐ 5 L ☐ 10 L ☐ 20 L ☐

YERLİ ÜRETİM

Organomineral Ürünler

NP'li Sıvı Organomineral Gübre

mebor-5 Priva

4-15-0 + ME

	UYGULAMA ZAMANI	Doz/yapraktan ml/100 L su ile	Doz/topraktan L /da
SEBZELER	Çiçeklenme öncesi, Çiçeklenmeden sonra ve İkinci uygulamadan 30-40 gün sonra	300	1-1,5
FINDIK, CEVİZ, BADEM	Yaprak çıkışı gözlendiğinde Meyve tutum başlangıcında	300	1-1,5
MEYVE AĞAÇLARI (Elma,armut,kiraz, şeftali,nar)	Yaprak oluşumundan hasat dönemine kadar Hasat sonundan yaprak dökümüne kadar	300	1-1,5
SEBZELER	Bitki 4-6 yapraklı olduğunda ilk uygulama yapılır ve hasada 15 gün kalana kadar sürdürülebilir.	150-200	1-1,5
ÜZÜM VE BAĞLARDA	Yaprak çıkışı gözlendiğinde Dane tutumunda	300	1-1,5
TARLA BİTKİLERİ	Aktif gelişme dönemi boyunca	200	1-1,5
PAMUK	Bitki boyu 10-15 cm olduğunda Tarak oluşumunda	200	1-1,5
ŞEKERPANCARI, AYÇİÇEĞİ, MISIR	Bitki boyu 10-15 cm olduğunda Birinci uygulamadan 10 gün sonra	200	1-1,5
NARENCİYE	Beyaz göz döneminde Beyaz gözler ayrıldığında	300	1-1,5
MUZ	Meyve oluşum döneminden itibaren	200	1-1,5
KESME ÇİÇEKÇİLİK	Yetişme dönemi süresince 2 kez	150-200	1-1,5

*Bu değerler tavsiye niteliğindedir. Uygun dozlar tarımsal analiz sonuçlarına göre ve bitkilerin gelişme durumuna göre uzman danışmanlar tarafından belirlenir ve ihtiyaç durumunda tekrarlanır.
*Yerli üretim
*Çiçeklenme dönemindeyken uygulama yapılması tavsiye edilmez

ÜRETİCİ FİRMA :
MEB METAL VE BİLEŞİKLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Barış Mah. 1804 / 2 Sok. No:24 Gebze-Kocaeli
Tel: (262) 641 77 10 Faks: (262) 646 53 45
www.mebor.com.tr ; www.mebgroup.com.tr

Piyasaya sunacağımız ürün üzerindeki etiket bilgilerinin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin tespiti halinde 7223 sayılı kanına göre yapılacak cezai işlemleri peşinen kabul ve taahhüt ederiz.